

# Mic 12c-GRUP D STREPTOKOKLAR

written by Dr. Aydođan Lermi

## GRUP D STREPTOKOKLAR

Zincir yapan gram+ katalaz negatif bakteriler. Streptokokyar yüzey proteinlerine göre guruplanabilirler. Grup D streptokoklar genellikle koagölaz negatif olup, hemolitik özellikleri türlerine göre deđişir. **LANCEFIELD** GURUPLAMAYA göre Grup D streptokoklar ENTEROKOKLAR ve NON ENTEROKOKLAR olarak ikiye ayrılırlar.

## ENTEROKOKLAR:

### 1. Enterokoklar:

- **Türler:** En yaygın türleri **Enterococcus faecalis** ve **Enterococcus faecium**dur.
- **Özellikler:** Normal bağırsak florasında bulunurlar; fakat bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon yapabilirler. İdrar yolu enfeksiyonları, endokardit ve bakteriyemi gibi durumlara neden olabilirler.
- **Hepsi penisiline dirençlidir.** Alfa - beta-gama hemoliz yapabilir. %6.5 NaCl, %40 safra, ve 45C de ürer. Eskülin hidroliz eder. İçlerinde en sık S. Fecalis enfeksiyon yapar: endokardit, UTİ, intra abdominal enfeksiyonlar, pnemoni, Sepsis, Subakut Bakteriyel Endokardir etkenidir.

### 2. Non-Enterokok Grup D Streptokoklar:

- **Streptococcus bovis, Streptococcus equinis** gibi türleri içerir.
- **Özellikler:** Genellikle bağırsaklarda bulunurlar ve bazı türleri kolon kanseri ile ilişkili hastalıklarda tedavi sürecinde önemlidir. Bakteriyel endokardit gibi enfeksiyonlara da yol açabilirler.
- **Hepsi penisiline hassastır.** %6.5 NaCl de üremez, %40 safrada ürer, 45C de ürer, eskülin - dir, alfa - gama hemoliz yapabilir,